



**BORIMED**

**60 ЛЕТ НАМ ДОВЕРЯЮТ САМОЕ ЦЕННОЕ**

# Цетиризин – противоаллергический препарат II-го поколения



# Аллергический ринит –

это воспаление и отек слизистой носа вследствие воздействия причинно-значимых аллергенов. Аллергический ринит вызывает заложенность носа и носовых пазух.



- По данным ВОЗ аллергический ринит присутствует у 20-40% населения планеты.
- Распространенность аллергического ринита среди детей колеблется от 8,5% в 6 лет до 34% у подростков.
- У мальчиков встречается чаще, чем у девочек.
- Рост заболеваемости отмечается с 6-ти лет и достигает пика к 15-18 годам.

# Аллергический конъюнктивит –

конъюнктивиты относятся к наиболее распространенной патологии глаз, составляя более 60% воспалительных заболеваний глаз.



- Аллергический конъюнктивит является наиболее распространенным синдромом глазной аллергии среди детей.
- Наиболее частыми формами, встречающимися у 15-20% популяции, являются сезонный (поллинозный) и круглогодичный хронический конъюнктивиты.

## Идиопатическая крапивница у детей –

это кожный симптом аллергии или другой патологии, связанной с выбросом гистамина. Свое название получила из-за покраснения и волдырей, очень похожих на ожог крапивы.



- Среди хронической крапивницы у детей на долю идиопатической приходится 90-95% от всех форм.
- Основным симптомом идиопатической крапивницы является появление на коже интенсивно зудящих **волдырных высыпаний**.
- Также симптомы: отеки кожи, повышение температуры тела, озноб, головные боли, общая слабость, недомогание, невротические нарушения.

# Показания к применению

## Для облегчения:

- назальных и глазных симптомов круглогодичного и сезонного **аллергического ринита** и **аллергического конъюнктивита**: *зуда, чиханья, заложенности носа, ринореи, слезотечения, гиперемии конъюнктивы*
- симптомов **хронической идиопатической крапивницы**



# Постановление МЗ РБ от 16.07.2007 №65

(ред. от 03.06.2024 №96)

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, **ВЫДАВАЕМЫЕ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ**, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАНАМ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЫДАВАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 НОЯБРЯ 2007 г. N 1650 "О ВОПРОСАХ БЕСПЛАТНОГО И ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ"

26.5	R06 Антигистаминные средства для системного применения		
26.5.1	R06A Антигистаминные средства для общего применения	Хлоропирамин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 1 мл
			Таблетки 25 мг
			Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг
			Раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл
			Порошок <=>
		Цетиризин	Капли для приема внутрь (внутреннего применения) 10 мг/мл 20 мл
		Лоратадин	Сироп 1 мг/мл 100 мл
	Таблетки 10 мг		
	Порошок <=>		

Лекарственный препарат  
Цетиризин, капли для  
приема внутрь 10 мг/мл  
20 мл включен в  
**Перечень основных  
лекарственных средств**

# Постановление МЗ РБ от 15.05.2024 №91

12.5	R06 Антигистаминные средства для системного применения:		
	R06A Антигистаминные средства для общего применения	Дифенгидрамин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 1 мл Таблетки 50 мг
		Кетотифен	Таблетки 1 мг
		Клемастин	Таблетки 1 мг Раствор для инъекций 1 мг/мл 2 мл
		Лоратадин	Сироп 1 мг/мл 100 мл Таблетки 10 мг
		Дезлоратадин	Капсулы 5 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг
		Хифенадин (в детской практике)	Таблетки 10 мг
		Хлоропирамин	Таблетки 25 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг Раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 1 мл
		Цетиризин	Капсулы 5 мг Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 10 мг Капсулы 10 мг
			Капли для приема внутрь (внутреннего применения) 10 мг/мл 20 мл

Лекарственный препарат Цетиризин, капли для приема внутрь 10 мг/мл 20 мл включен в **Республиканский формуляр лекарственных средств**



# Постановление МЗ РБ от 10.04.2019 №27

(ред. от 09.02.2023 №27)

R06 Антигистаминные средства для системного применения	R06A Антигистаминные средства для общего применения		
		Биластин	таблетки
		Дезлоратадин	капсулы, сироп, таблетки
		Диметинден	капли
		Доксиламин	капли, таблетки, таблетки шипучие
		Дименгидрилат	таблетки
		Кетотифен	сироп, таблетки
		Левосетиризин	капли, таблетки
		Лоратадин	сироп, таблетки
		Сехифенадин	таблетки
		Хифенадин	таблетки
		Хлоропирамин	таблетки
		<b>Цетиризин</b>	<b>капли, капсулы, таблетки</b>
		Эбастин	таблетки

Лекарственный препарат  
Цетиризин, капли для  
приема внутрь 10 мг/мл  
20 мл включен в  
**Перечень лекарственных  
препаратов,  
реализуемых без  
рецепта врача**

# Цетиризин

капли для приема внутрь 10 мг/мл



Блокатор H1-гистаминовых рецепторов II-го поколения

**НЕ** проникает через ГЭБ

Cetirizine



**НЕ** обладает седативным и холинолитическим эффектами

# Фармакокинетические параметры

- Цетиризин — длительно действующий препарат с быстрым началом действия
- **Терапевтический эффект** цетиризина проявляется уже после однократного приема разовой дозы и сохраняется в течение 24 ч
- **Период полувыведения** составляет около 10 ч
- До 2/3 принятой дозы препарата **выводится** в неизменном виде с **мочой**
- В более раннем возрасте (2–4 года) **период полувыведения** цетиризина после однократного приема в дозе 5 мг соответствовал 4,9 ч, а у новорожденных — 2,4 ч

# Способ применения и дозы


Пациенты	Дозы	Способ применения
Взрослые и дети старше 12 лет	10 мг (24 капли)/1 раз в сутки	Раствор следует либо накапать в ложку, либо разбавить водой и принять внутрь. <b>Применение препарата не зависит от приема пищи.</b>
Дети 6-12 лет	5 мг (12 капель)/2 раза в сутки	
Дети 2-5 лет	2,5 мг (6 капель)/2 раза в сутки	
Дети от 1 года до 2 лет	2,5 мг (6 капель)/1 или 2 раза в сутки	
Дети от 6 месяцев до 1 года	2,5 мг (6 капель)/1 раз в сутки	

по рецепту  
врача!



# Снижение симптомов аллергического ринита и конъюнктивита на фоне лечения

Цетиризин **более эффективно** купирует симптомы аллергического ринита и конъюнктивита по сравнению с другими антигистаминными препаратами, в том числе и метаболитами второго поколения



← → ↻ cetirizine.by/Drops

## ПИЩЕВОЙ ДНЕВНИК

Пищевой дневник – удобный инструмент для консультации со специалистом и обмена опытом с другими мамами.



[Открыть дневник](#)

ОТПРАВИТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

[Отправить](#)

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА

При вводе в рацион новых ингредиентов – особое внимание к заполнению дневника. Для этого есть



Веб-сайт [cetirizine.by](http://cetirizine.by) – это отличный способ быстро получить всю необходимую информацию о препарате Цетиризин: Где купить? Как принимать? Скачать пищевой дневник и многое другое.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**