
BORIMED
60 ЛЕТ НАМ ДОВЕРЯЮТ САМОЕ ЦЕННОЕ

Цитиколин

раствор для приема внутрь 100 мг/мл во флаконе 50 мл

БЕЗ РЕЦЕПТА

Ноотропный препарат

для улучшения когнитивных функций
и восстановления после инсультов
и черепно-мозговых травм

Республиканский формуляр

Безрецептурный перечень ЛС

BORIMED

Дополнительный объем 50 мл препарата Цитиколин, раствор для приема внутрь включен в Республиканский формуляр лекарственных средств



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Галоўнае ўпраўленне арганізацыі медыцынскай дапамогі

вул.Мяснікова,39, 220030, г.Мінск
тэл. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Главное управление организации медицинской помощи

ул.Мясникова,39, 220030, г.Минск
тел. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by

03.02.2025 № 01/2025/64
На № 35-13/7388 от 20.11.2024

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»
Первому заместителю генерального директора – главному инженеру
Демяшкевичу Д.В.
E-mail: borimed@borimed.by

О рассмотрении предложения

На заседании 23 января 2025 года Республиканской формулярной комиссией был рассмотрен вопрос о включении в Республиканский формуляр лекарственных средств (далее – РФЛС) дополнительный объем/фасовку лекарственного средства (далее – ЛС) Цитиколин, раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл.

Принято решение включить дополнительный объем/фасовку ЛС Цитиколин, раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл в РФЛС на 2025 год.

Начальник главного управления организации медицинской помощи
Заместитель председателя РФК Л.Ч.Недень

Механизм действия Цитиколина

Нейропротекция

- Защищает мембраны нервных клеток от повреждения
- Снижает уровень «плохих» медиаторов (например, глутамат) и повышает уровень «хороших» (ацетилхолин, допамин)
- Ингибирует перекисное окисление липидов
- Препятствует накоплению бета-амилоида (накопление β-амилоидных бляшек в ткани мозга – одно из основных патоморфологических проявлений болезни Альцгеймера)

Нейрорепарация

- Ингибирует апоптоз (гибель клеток)
- Стимулирует ангиогенез (процесс образования новых кровеносных сосудов)
- Усиливает нейрогенез (процесс образования новых нервных клеток)
- Усиливает глиогенез (увеличение пролиферации и дифференцировки астроглиальных клеток) и др.

BORIMED



Показания к применению

(согласно инструкции)

- Лечение неврологических и когнитивных нарушений, связанных с нарушением мозгового кровообращения
- Лечение неврологических и когнитивных нарушений, связанных с травматическим повреждением головного мозга

BORIMED

Показания к применению

- ✓ Когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга
- ✓ Ишемический инсульт (острый период) *в составе комплексной терапии*
- ✓ Ишемический и геморрагический инсульт (восстановительный период)
- ✓ Черепно-мозговая травма (острый *(в составе комплексной терапии)* и восстановительный период)

BORIMED

Режим дозирования и способ применения

1 мл раствора =
100 мг цитиколина

- Взрослые

Рекомендуемая доза составляет от 500 до 2000 мг **(5-20 мл)** в сутки в зависимости от тяжести симптоматики

- Дети

Препарат следует применять только в том случае, если ожидаемая терапевтическая польза превышает любой возможный риск (после консультации врача)

Для обеспечения точного дозирования – стакан дозирующий в комплекте

BORIMED



Применение препарата Цитиколин, раствор для приема внутрь 100 мг/мл регламентировано Клиническими протоколами ***«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями нервной системы (детское население)»*** (Постановление МЗ РБ от 12.04.2023 №53 «Об утверждении клинического протокола») и ***«Диагностика, лечение и медицинская профилактика инфаркта мозга (детское население)»*** (Постановление МЗ РБ от 31.07.2024 №127 «Об утверждении клинического протокола»)

BORIMED

В IV квартале 2025 года планируется выпуск лекарственного препарата Цитиколин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг/4мл №5

BORIMED

BORIMED

Спасибо за внимание!