



BORIMED

НАМ ДОВЕРЯЮТ САМОЕ ЦЕННОЕ!


ДЕКСкетопрофен – новый нестероидный и противовоспалительный препарат




Saurav Chemicals Limited, Индия



Чем лучше **ДЕКС**кетопрофен?




Кетопрофен
S(+)-изомер,
R(-)-изомер




Декскетопрофен
S(+)-изомер

Правовращающий S(+)-изомер кетопрофена – декскетопрофен



Кетопрофен
S(+)-изомер
R(-)-изомер



Декскетопрофен
S(+)-изомер

Декскетопрофен в отличие от кетопрофена содержит 99,9% активного S(+)-изомера.

Соединение декскетопрофена с трометамоловой солью и высокая степень очистки действующего вещества от R(-)-кетопрофена обеспечивают более высокие терапевтическую эффективность и безопасность.

ДЕКСкетопрофен

раствор для в/в и в/м введения 25 мг/мл 2 мл №5

БЕЗ
РЕЦЕПТА



Республиканский
формуляр

Безрецептурный
перечень ЛС

Симптоматическое лечение
острого болевого синдрома
средней и выраженной
интенсивности при невозможности
пероральной терапии, например при

- послеоперационной боли
- почечной колике
- боли в пояснице

Режим дозирования

1 амп. (2 мл) = 50 мг



Рекомендуемая доза
составляет 50 мг (2 мл) с
интервалом 8-12 часов
(не более 150 мг/сутки)

Для кратковременного применения!
Использовать только в период острой
боли (не более двух суток)

Фармакокинетика



Раствор для в/в и в/м введения/концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл

- После внутримышечного введения **максимальная концентрация** достигается примерно через 20 минут (10-45 мин)
- **Связывание с белками плазмы – 99%**
- **Период полувыведения – 1-2,7 ч**
- **Выводится через почки**

ДЕКСкетопрофен

таблетки, п/о пленочной, 25 мг №10

БЕЗ
РЕЦЕПТА



Безрецептурный
перечень ЛС

Кратковременное
симптоматическое лечение при
остром болевом синдроме
от легкой до средней степени
интенсивности, например, при

- острой боли в мышцах и костях
- дисменорее
- зубной боли

Режим дозирования

1 табл. = 25 мг



Рекомендуемая доза
составляет по 12,5 мг
каждые 4-6 часов или
25 мг каждые 8 часов
(не более 75 мг/сутки)

Лечение должно быть **ограничено**
периодом проявления симптомов

Фармакокинетика



Таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

- После приема внутрь **максимальная концентрация** достигается примерно через 30 минут (15-60 мин)
- Одновременный **прием пищи** замедляет всасывание декскетопрофена
- **Связывание с белками плазмы** – 99%
- **Период полувыведения** – 4-6 ч
- **Выводится** через почки

Применение у детей

Эффективность и
безопасность применения
препарата ДЕКСкетопрофен у
детей не изучались,
применение препарата у
детей **противопоказано**





Применение во время беременности и лактации

Препарат ДЕКскетопрофен (раствор для инъекций/таблетки) **противопоказан** в третьем триместре беременности и в период лактации



Спасибо за внимание!