



# BORIMED

60 ЛЕТ НАМ ДОВЕРЯЮТ САМОЕ ЦЕННОЕ

# Валсартан – антигипертензивный препарат Блокатор рецепторов ангиотензина II



*Риска предназначена для деления таблетки на 2 равные дозы*

# Показания к применению

Валсартан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг и 160 мг



- лечение **артериальной гипертензии** у взрослых и детей от 6 до 18 лет;
- лечение **сердечной недостаточности** с клинической симптоматикой у взрослых пациентов;
- лечение **после** недавно перенесенного **инфаркта миокарда** (12 часов - 10 дней).

# Режим дозирования

## При артериальной гипертензии

**Рекомендуемая начальная доза** препарата для взрослых составляет 80 мг или 160 мг **1 раз/сутки**.

*Антигипертензивный эффект достигается в течение двух недель, а максимальный эффект наступает через четыре недели.*

Пациентам, у которых не удается достичь адекватного снижения артериального давления, суточную дозу можно повысить до 160 мг или максимально до 320 мг

**!Валсартан можно назначать совместно с другими антигипертензивными препаратами**

# Режим дозирования у детей (от 6 до 18 лет)

## При артериальной гипертензии

Для детей с массой тела **< 35 кг начальная доза** составляет **40 мг 1 раз/сутки**, с массой тела **35 кг и >** начальная доза составляет **80 мг 1 раз/сутки**.

Масса тела	Максимальные дозы, изученные в клинических испытаниях
≥18 кг <35 кг	80 мг
≥35 кг < 80 кг	160 мг
≥80кг ≤ 160 кг	320 мг

При необходимости назначения валсартана в дозе 40 мг таблетки 80 мг можно разделить на равные дозы!

# Режим дозирования

## При сердечной недостаточности

**Рекомендуемая начальная доза составляет 40 мг 2 раза/сутки.**

*Повышение дозы до 80 мг и 160 мг два раза в сутки должно осуществляться с интервалом не менее 2 недель, с учетом переносимости препарата пациентом.*

При необходимости назначения валсартана в дозе 40 мг таблетки 80 мг можно разделить на равные дозы!

**!Валсартан можно назначать совместно с другими препаратами, применяемыми для лечения сердечной недостаточности**

# Режим дозирования

## Постинфарктное состояние

У клинически стабильных пациентов лечение можно начать уже через 12 часов после инфаркта миокарда. После начальной дозы 20 мг **2 раза/сутки** дозу валсартана необходимо увеличивать до 40 мг, 80 мг и 160 мг **2 раза/сутки** в течение следующих нескольких недель.

Максимальная доза -  
160 мг 2 раза/сутки.

**!** Валсартан можно назначать пациентам, которые лечились препаратами, рекомендованными после инфаркта миокарда (например, тромболитиками, ацетилсалициловой кислотой, бета-блокаторами и статинами).

*Не рекомендуется одновременный прием  
тройной комбинации валсартана, иАПФ и бета-  
блокатора или калийсберегающего диуретика!*

## Сартаны и ингибиторы АПФ

**Сартаны и ингибиторы АПФ** взаимозаменяемы, поэтому при непереносимости или неэффективности одной группы возможно заменить ее на другую.

Если **ингибиторы АПФ вызывают сухой навязчивый кашель**, который провоцирует головную боль и ухудшает общее состояние, пациенту целесообразно перейти на терапию сартанами.

**!** Одновременный прием лекарственных препаратов из обеих групп не имеет практического смысла.



Валсартан **противопоказан**  
во время беременности и  
**не рекомендуется** во время  
кормления груди!

# Сравнительная характеристика «сартанов»

Лекарственное средство	Доза, мг	$T_{1/2}$ , ч	$T_{max}$ , ч	F, %	Влияние пищи	Vd, л	Пути выведения, печень/ почки	CYP метаболизм
Ирбесартан	75–300	11–15	1,3–3	60–80%	–	53–93	80/20	2C9, 3A4
Лозартан	25–100	2	1–1,5	33%	да	34/12	60/35	2C9, 3A4
<b>Валсартан</b>	<b>80–320</b>	<b>6</b>	<b>2–4</b>	<b>23–50%</b>	<b>да</b>	<b>16–17</b>	<b>83/13</b>	<b>2C9</b>
Кандесартана цилекситил	8–32	9	2–5	42%	–	9,1	67/33	2C9
Телмисартан	40–80	24	0,5–1	43%	–	500	>97/<1	нет
Олмесартана медоксомил	20–40	12–14	1,7–2,5	26%	–	17,1	50–65/35–50	нет
Азилсартана медоксомил	20	12	1,5–3	60%	–	16	55/42	2C9, CYP2B6 CYP2C8

$T_{1/2}$  – период полувыведения

F – биодоступность

$T_{max}$  – время до достижения максимальной концентрации в плазме

Vd – объем распределения

*Эффективность и безопасность сартанов в клинической практике (БГМУ, Минск)  
Королева А.А., Журавков Ю.Л.*

# Наличие препарата Валсартан в перечнях РБ

## 1. Перечень основных лекарственных средств

Постановление МЗ РБ от 16.07.2007 г. №65 (ред. 03.06.2024 №96)

## 2. Республиканский формуляр

Постановление МЗ РБ №91 от 15.05.2024

## 3. Перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача

Постановление МЗ РБ от 10.04.2019г. №27 (ред. 14.06.2023 №101)



# Ирбесартан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Напоминаем! В 2020 году  
освоен монопрепарат  
Ирбесартан в 3-ех дозировках



Перечень  
основных ЛС

Республиканский  
формуляр

Безрецептурный  
перечень ЛС

# Показания к применению



- Лечение эссенциальной артериальной гипертензии
- Лечение поражений почек у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа в составе комбинированной антигипертензивной терапии

## Режим дозирования

300  
мг

Предпочтительная поддерживающая доза при поражении почек при артериальной гипертензии и сахарном диабете

150  
мг

Обычная начальная доза

75  
мг

Доза у пациентов на гемодиализе и старше 75 лет

# Ирбесартан+Гидрохлортиазид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой


Напоминаем! В 2024 году  
освоена комбинация ЛС  
Ирбесартан+Гидрохлортиазид



Республиканский  
формуляр

Безрецептурный  
перечень ЛС

# Показание к применению



Эссенциальная  
артериальная гипертензия

*Внутри 1 раз в день  
независимо от  
приема пищи*



Спасибо за внимание!